




大腸内視鏡検査で使う下剤について(当院で使用している下剤です。患者様ご自身で選択可能です)

	特徴	飲み方
<p>モビプレップ</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ・液剤です。 ・梅のような味でやや塩味もあります。 ・ご自宅で内服される場合は水を入れて、ご自身で準備していただく必要があります。 ・洗浄力が高いです。 	<ul style="list-style-type: none"> ・1時間～1時間半かけて下剤1Lと水500mlを飲みます。 ・お通じの状況によっては下剤や水を追加で飲んでいただくことがあります。便がきれいになれば終了です。 ・水の代わりにお茶でも大丈夫です。 ※当院で前処置を行う場合、お茶を希望される方はご持参ください。
<p>サルプレップ</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ・液剤です。 ・レモン風味で甘みがあります。 ・下剤の飲む量が比較的少ないです。 ・このまま内服できるので準備が不要です。 ・洗浄力が高いです。 ・腎臓が悪い方は使えません。 	<ul style="list-style-type: none"> ・10分間で下剤120mlと水(コップ2杯分)を飲みます。これを4回繰り返します。 ・お通じの状況によっては下剤や水を追加で飲んでいただくことがあります。便がきれいになれば終了です。 ・水の代わりにお茶でも大丈夫です。 ※当院で前処置を行う場合、お茶を希望される方はご持参ください。
<p>ビジクリア</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ・錠剤のお薬です。 ・液剤で気分不良のあった方、液剤の味が苦手な方におススメです。 ・錠剤は大きめなので飲みにくく感じる方もいらっしゃるかもしれません。 ・高齢者で高血圧症の治療をされている方は内服できません。 ・腎臓が悪い方は使えません。 	<ul style="list-style-type: none"> ・15分ごとに5錠の薬+水200mlを合計10回飲みます。(2時間半で合計薬50錠、水2L) ・内服開始から検査まで4時間～6時間と液剤を比べると時間がかかりますので、早い時間からご自宅での服用をお勧めします。 ・水の代わりにお茶でも大丈夫です。 ※当院で前処置を行う場合、お茶を希望される方はご持参ください。